

大野クリニック人間ドック 検査項目

分類	検査項目	人間ドックAコース (おすすめ)		人間ドックBコース (標準)	
		45,000円(税込)	44,000円(税込)	38,500円(税込)	37,500円(税込)
		男性	女性	男性	女性
問診	標準的な質問票22項目を含む	◎	◎	◎	◎
	既往歴・自覚症状・他覚症状	◎	◎	◎	◎
基本	身長・体重	◎	◎	◎	◎
	腹囲測定	◎	◎	◎	◎
	BMI	◎	◎	◎	◎
	座位血圧(収縮期・拡張期)	◎	◎	◎	◎
	視力(裸眼/矯正)	◎	◎	◎	◎
	聴力検査(オーディオ)	◎	◎	◎	◎
尿	尿蛋白・尿糖	◎	◎	◎	◎
	尿潜血	◎	◎	◎	◎
	尿比重	◎	◎	◎	◎
	尿沈渣	◎	◎	◎	◎
	PH	◎	◎	◎	◎
血液一般	赤血球数	◎	◎	◎	◎
	白血球数	◎	◎	◎	◎
	ヘマトクリット	◎	◎	◎	◎
	ヘモグロビン	◎	◎	◎	◎
	血小板数	◎	◎	◎	◎
	MCV・MCH・MCHC	◎	◎	◎	◎
	血液像	◎	◎	◎	◎
肝機能	AST(GOT)・ALT(GTP)・γ-GTP	◎	◎	◎	◎
	LDH	◎	◎	◎	◎
脂質	HDLコレステロール・LDLコレステロール	◎	◎	◎	◎
	総コレステロール	◎	◎	◎	◎
	中性脂肪	◎	◎	◎	◎
糖質	空腹時血糖もしくは随時血糖	◎	◎	◎	◎
	HbA1c(NGSP)	◎	◎	◎	◎
腎機能	クレアチニン・eGFR	◎	◎	◎	◎
	尿酸	◎	◎	◎	◎
	尿素窒素	◎	◎	◎	◎
眼科	眼底検査(両眼)※両眼実施不可(は片眼)	◎	◎	◎	◎
肺機能	肺機能検査(スパイロメーター)	◎	◎	◎	◎

分類	検査項目	人間ドックAコース (おすすめ)		人間ドックBコース (標準)	
		45,000円(税込)	44,000円(税込)	38,500円(税込)	37,500円(税込)
循環器	心電図	◎	◎	◎	◎
	心拍数	◎	◎	◎	◎
腹部	腹部エコー (胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、大動脈)	◎	◎	◎	◎
胸部	胸部X線(2方向)	◎	◎	◎	◎
	胸部CT検査 低線量CT ※1	◎	◎		
大腸	便潜血(2回法)	◎	◎	◎	◎
胃部	内視鏡検査(経口/経鼻)	◎	◎	◎	◎
その他 血液検査	ALP	◎	◎	◎	◎
	総蛋白	◎	◎	◎	◎
	アルブミン	◎	◎	◎	◎
	総ビリルビン	◎	◎	◎	◎
	CRP	◎	◎	◎	◎
	Na	◎	◎	◎	◎
	K	◎	◎	◎	◎
	Cl	◎	◎	◎	◎
甲状腺	血液検査(TSH)	◎	◎	◎	◎
	血液検査(FT3)	◎	◎	◎	◎
	血液検査(FT4)	◎	◎	◎	◎
感染症	B型肝炎(HBs抗原)	◎	◎	◎	◎
	C型肝炎(HCV抗体)	◎	◎	◎	◎
腫瘍 マーカー	PSA(前立腺がん)40歳以上 ※当院では他の腫瘍マーカーも実施できますが、症状等があり疾患の疑いがある場合に保険診療で実施をしています。	◎		◎	

※1低線量胸部CTについて

胸部レントゲン検査と比較して、胸部CTによる肺がん発見率は約10倍程度高く、発見された肺がんは早期比率が高くその分治療成績が良好であるとデータで示されています。米国国立癌研究所では「喫煙者に対する低線量CT検査による肺がん検診により死亡率が低下した」と報告されています。

メリット ①従来の胸部レントゲン検査(+喀痰細胞診)より肺がんの早期発見率が高い。

②肺気腫や気管支拡張症、肺結核、抗酸菌症なども同時に発見できることがある。

③フィルター技術等の進歩により胸部レントゲン検診の数回分と同等の低線量による検査が可能となった。

デメリット①見つからなくてもよい良性疾患までもが発見され、良性・悪性の鑑別のための精密検査や経過観察も追加で必要になる場合がある。